



¹ Problemas de riesgo vital:

Vía aérea: edema, ronquera, estridor

Respiración: taquipnea, sibilancias, fatiga, cianosis, Sp_{O₂} < 92 %, confusión

Circulación: palidez, frialdad, tensión arterial baja, mareo, somnolencia/coma

² Adrenalina (administre IM salvo que tenga experiencia con adrenalina IV)

Dosis IM de adrenalina 1:1000 (repita tras 5 min si no mejora)

- Adulto 500 µg IM (0,5 mL)
- Niño de más de 12 años 500 µg IM (0,5 mL)
- Niño de 6-12 años 300 µg IM (0,3 mL)
- Niño de menos de 6 años 150 µg IM (0,15 mL)

Adrenalina IV para administración solo por especialistas con experiencia

Dosis: Adultos 50 µg; Niños 1 µg Kg⁻¹

³ Carga de líquidos IV (cristaloides):

- Adulto 500 - 1000 mL
- Niño 20 mL kg⁻¹

Detenga coloides IV si éstos pudieran ser la causa de anafilaxia

⁴ Clorfenamina
(IM o IV lento)

- Adulto o niños de más de 12 años 10 mg
- Niños de 6 a 12 años 5 mg
- Niños de 6 meses a 6 años 2,5 mg
- Niños de menos de 6 meses 250 µg kg⁻¹

⁵ Hidrocortisona
(IM o IV lento)

- 200 mg
- 100 mg
- 50 mg
- 25 mg